

خصوصیات رایج نورولوژیک در MPS بر اساس زیرگروه¹³

یافته های نورولوژیک	H-MPS I	S/H-MPS I	S-MPS I	MPS II شدید	MPS II خفیف	MPS III	MPS IV	MPS VI	MPS VII
تأخیرات رشدی	++	+	—	++	—	++	—	—	++
ناهنجاری های رفتاری	—	—	—	++	—	++	—	—	—
تشنج	—	—	—	++	—	++	—	—	+
هیدروسفالوس	++	+	—	++	+	++	+	++	—
آتروفی مغز	+	—	—	++	—	++	—	—	—
کیست های عنکبوتی	+	+	+	+	+	+	—	+	—
ضایعات سیستیک	++	+	+	++	+	+	—	++	—
ناشنوائی حسی عصبی	++	++	++	++	++	++	+	++	+
ادم پایی/آتروفی نوری	++	++	—	++	++	+	—	++	+
سابلاکشن/فشرده گی طناب نخاعی 2C-1C	+	—	—	—	—	—	++	+	+
پاکی مننژیت گردنی	+	++	+	—	+	—	—	++	—
تأخیرات رشدی	++	++	++	++	++	—	+	++	—
++ شایع + رایج — نادر یا گزارش نشده									

برگرفته از Kakkis, Principles of Child Neurology, 1996.

حروف اختصاری: H-MPS I، سندروم موکوپلی ساکاریدوز هورلر؛ S/H-MPS I، سندروم موکوپلی ساکاریدوز هورلر-شای؛ S-MPS I، سندروم موکوپلی ساکاریدوز شای.