

خصوصیات رایج نورولوژیک در MPS بر اساس زیرگروه⁶

یافته های نورولوژیک	H-MPS I	S/H-MPS I	S-MPS I	SPM II، پیش رونده سریع	SPM II، پیش رونده کند	MPS III	MPS IV	MPS VI	MPS VII
تأخیرات رشدی	++	+	-	++	-	++	-	-	++
ناهنجاری های رفتاری	-	-	-	++	-	++	-	-	-
تنشج	-	-	-	++	-	++	-	-	+
هیدروسفالوس	++	+	-	++	+	++	+	++	-
آتروفی مغز	+	-	-	++	-	++	-	-	-
کیست های عنکبوتی	+	+	+	+	+	+	-	+	-
ضایعات سیستمیک	++	+	+	++	+	+	-	++	-
ناشنوایی حسی عصبی	++	++	++	++	++	++	+	++	+
ادم پایی/آتروفی نوری	++	++	-	++	++	+	-	++	+
سابلاکسشن/فشریدگی طناب نخاعی IC-2C	+	-	-	-	-	-	++	+	+
پاکی منژیت گردنی	+	++	+	-	+	-	-	++	-
سندروم کاریال تونل	++	++	++	++	++	-	+	++	-

++ شایع + رایج - نادر یا گزارش نشده

برگرفته از Kakkis, *Principles of Child Neurology*, 1996.

حروف اختصاری: H-MPS I، سندروم موکوپلی ساکاریدوز هورلر؛ S/H-MPS I، سندروم موکوپلی ساکاریدوز هورلر-شای؛ S-MPS I، سندروم موکوپلی ساکاریدوز شای.