

تظاهرات و نمودهای SPM که می توانند بر عملکرد تنفس اثر بگذارند⁵

| تظاهرات | % بیماران (21=N) |
|------------------------------------|------------------|
| تنگ شدن مجاری هوای پرینزیپال | 67 |
| هیپریزوفری لوزه/غده لوزه حلقی | 57 |
| ماکروگلوبولین | 86 |
| انسداد نازوفارینژیا | 92 |
| تنگ شدن سوپرا گلوتیک | 62 |
| تنگ شدن اینفرا گلوتیک | |
| <hr/> | |
| بیماری ریوی | |
| نقص انسدادی | 71 |
| آنتکتازی کائونی | 35 |
| ذات الریه مکرر | 40 |
| علامت های سیستیت بینایینی | 24 |
| شریان هیپوکسی بیدار | 57 |
| شریان هیپوکسی خواب | 100 |
| <hr/> | |
| آپنه خواب | |
| مرکزی | 0 |
| انسدادی | 89 |
| <hr/> | |
| بدشکلی متون فقرات توراسیک و لومبار | |
| اسکولیوز | 67 |
| هابیتر کیفوز توراسیک | 62 |
| هابیتر لوردوزیس لومبار | 38 |
| گیبوس توراسیک و لومبار | 57 |
| <hr/> | |
| درگیری نخاع گردنی | |
| سابلاکشن نخاع گردنی | 68 |
| هیپرپلازی ادونتوئید | 69 |
| فرشدگی طناب نخاعی | 63 |