

**Morquio A'nın (MPS IVA) klinik bulguları**

<b>Organ sistemi</b>	<b>Komplikasyonlar</b>
<b>Kardiyovasküler<sup>7-9</sup></b>	Mitral ve aort kapaklarının ağır derecede kalınlaşması sık görülür ve şunlara yol açar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapak yetersizliği</li> <li>• Sol ventrikül hipertrofisi</li> <li>• Kapak stenozu</li> <li>• Ölüm</li> </ul>
<b>Pulmoner<sup>1,6,7,10,11</sup></b>	Hava yollarında belirgin GAG birikimi, göğüs duvarında restriksiyon, solunum kası zayıflığı ve servikal miyelopati sonucu çok faktörlü etiyoloji meydana gelir ve şunlara yol açar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uykuda düzensiz solunum (örneğin, obstrüktif uykú apnesi)</li> <li>• Tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları</li> <li>• Üst hava yolunun kollabey olmasi</li> <li>• Solunum yetmezliği</li> <li>• Ölüm</li> </ul>
<b>Nörolojik<sup>6,12</sup></b>	Yumuşak doku kalınlaşması ve odontoid hipoplaziden kaynaklanan, şiddetli üst servikal omurilik sıkışması sık görülür ve şunlara yol açar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servikal miyelopati</li> <li>• Tetrapleji</li> <li>• Ölüm</li> </ul>
<b>Kas-iskelet<sup>1,6</sup></b>	Önemli ve iyi karakterize edilmiş iskelet ve bağ doku tutulumu şunlara sonuçlanır: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Boy kısalığı</li> <li>• Boyun/servikal omur sıkışması</li> <li>• Kemik deformitesi</li> <li>• Dizostozis multipleks</li> <li>• Odontoid hipoplazi</li> <li>• Göğüs protrüsyonu</li> <li>• Kifoskolyoz</li> <li>• Eklem laksisitesi</li> </ul>
<b>Romatolojik<sup>5,13</sup></b>	Aşağıdakiler dahil, birden fazla romatolojik bulgu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eklem hipermobilitesi</li> <li>• Bağ dokunun bozulması</li> <li>• Zayıf tutuş, giyinme, kişisel hijyen ve yazmada gittikçe artan şekilde zorlanma</li> </ul>
<b>Oftalmolojik<sup>1,14,15</sup></b>	Keratositlerde ve endotel hücrelerinde GAG ve lipid birikimi şunlara yol açar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yaygın kornea bulanıklığı</li> <li>• Kataraktlar</li> <li>• Görme keskinliğinde azalma</li> </ul>
<b>Kulak, burun ve boğaz<sup>1,16</sup></b>	Sensorinöral GAG birikimi, tekrarlayan üst solunum yolu enfeksiyonları ve ossikül deformitesi şunlara yol açar: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Karışık iştme kaybı</li> <li>• Ömrün ikinci on yılina kadar şiddetli, gittikçe artan iştme kaybı</li> </ul>
<b>Karın bolgesi<sup>13</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hepatomegalı</li> <li>• Splenomegalı</li> </ul>
<b>Dental<sup>6</sup></b>	Şiddetli dental belirtiler ve semptomlar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zayıf diş gelişimi</li> <li>• Diş çürüklüğü</li> <li>• Anormal ince diş minesi</li> <li>• Geniş aralıklı dişler</li> <li>• Kuruk riski</li> </ul>

Kısaltmalar: GAG, glikozaminoglikan; MPS, mukopolisakkaridoz.